








### Klyde




*Recurvirostra avocetta*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Pied avocet  
 Säbelschnäbler  
 Kluit

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
Let genkendelig på grund af det smalle, spidse og opad krummede næb.	<b>Yngler</b> ved kysterne i den vestlige del af Østersøen og helt over til Frankrig, i Middelhavsområdet såvel som i steppemråder fra Ungarn til Kina. Yngler endvidere i Øst- og Sydafrika.	<b>Ynglested:</b> Yngler i vegetationsfattige områder på kysten, f.eks. områder med grus og sten eller strandenge.	Små hvirvelløse dyr som fanges på helt lavt vand - krebsdyr, insekter, lejlighedsvis også fiskeyngel. Søger føde ved at svinge hovedet opad for at fange føde af næbbet gennem vand.	 4  23-25 dage  35-42 dage

**Andet**

Klyde: 27 år og 10 måneder.  
 Når fået **navn** efter sit karakteristiske kald - "kly".  
 er rede, æg og unger ved med heftige greb og skrig at jage "truslen" bort.  
 glene har brug for meget varme og derfor ofte krybe ind under de voksnes fjerdrag.

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fuglere i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

### Klyde




Illustration: Staffen Walentz





# Trækfugleprofiler

Vejledning til ornitologiske ture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet



Wadden Sea National Park



Udarbejdelsen af trækfugleprofilerne er baseret på en uddeling ("Exkursionsblætter") fra Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Vadehav til ornitologiske arrangementer som en del af de årlige trækfugledage i Nationalpark Niedersächsisches Vadehav. Ideen og alle tegninger samt revisionen af teksterne blev stillet til rådighed for Den Internationale Vadehavsskole til udvikling af en verdensarvsudgave til brug i uddannelsesarbejdet i hele Vadehavet.

[www.zugvogeltage.de](http://www.zugvogeltage.de)



Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer  
Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven, Germany  
[www.nationalpark-wattenmeer.de](http://www.nationalpark-wattenmeer.de)



WWF Deutschland  
International Wadden Sea School  
Hafenstraße 3, 25813 Husum, Germany  
[www.iwss.org](http://www.iwss.org)



EDUCATION &  
INTERPRETATION  
FOR THE  
WADDEN SEA  
WORLD HERITAGE



UNITED FOR



[www.waddensea-worldheritage.org](http://www.waddensea-worldheritage.org)  
[www.nationalpark-wattenmeer.de](http://www.nationalpark-wattenmeer.de)  
[www.iwss.org](http://www.iwss.org)

Redaktører: Anke Hofmeister (Wadden Sea National Park Authority of Lower Saxony), Anja Szczesinski (WWF Germany)  
Tekstgrundlag: Dr. Jochen Dierschke, Petra Potel  
Teknisk rådgivning: Peter Südbeck, Dr Rune Michaelis, Dr Florian Packmor (Wadden Sea National Park Authority of Lower Saxony), Reno Lottmann, Klaus Günther (Wadden Sea Protection Station) og andre medlemmer af den trilaterale ekspertgruppe for træk- og ynglefugle  
Titelfoto: Lukas Lehmann  
Illustrationer: Steffen Walentowitz, Claus Rabba (individually credited)  
Kort over trækruter: Reno Lottmann  
Design: Liebmann Feine Grafik  
Kilde: Filen kan downloades gratis til formidlere af vadehavsundervisning på [www.iwss.org/resources](http://www.iwss.org/resources)

1. udgave 2024

Kilder:

Koffijberg K., Bregnballe T., Frikke J., Gnep B., Hälterlein B., Hansen M. B., Körber P., Reichert G., Umland J., van der Meij T. 2020. **Breeding Birds in the Wadden Sea: Trends 1991–2017 and results of total counts in 2006 and 2012.** Wadden Sea Ecosystem No. 40. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.

Kleefstra R., Bregnballe T., Frikke J., Günther K., Hälterlein B., Hansen M.B., Hornman M., Ludwig J., Meyer J., Scheiffarth G. 2022. **Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988–2019/2020.** Wadden Sea Ecosystem No. 41. Common Wadden Sea Secretariat, Expert Group Migratory Birds, Wilhelmshaven, Germany.

van Roomen M., Citegetse G., Crowe O., Dodman T., Hagemeyer W., Meise K., Schekkerman H. (eds) 2022. **East Atlantic Flyway Assessment 2020. The status of coastal waterbird populations and their sites. Wadden Sea Flyway Initiative p/a CWSS,** Wilhelmshaven, Germany, Wetlands International, Wageningen, The Netherlands, BirdLife International, Cambridge, United Kingdom.

BirdLife International. 2021. **European Red List of Birds.** Luxembourg: Publications Office of the European Union.

## Fuglediversitet i Verdensarv Vadehavet – Oplev og inspirer

Vadehavet ved Nordsødkysten i Tyskland, Danmark og Holland er en unik rasteplads for mere end ti millioner trækfugle. Hvert forår og efterår samler de energi her til deres langdistanceflyvninger langs den østatlantiske trækroute, som strækker sig fra den arktiske tundra til Afrikas kyster. De forskelligartede levesteder – fra det åbne hav til vadeblader og strandeng – giver fuglene hårdt tiltrængt føde og ly på deres ofte tusindvis af kilometer lange trækroute.

Vadehavets centrale rolle som rasteplads for trækfugle og dets ekstraordinære biodiversitet var blandt de afgørende faktorer for, at det blev anerkendt som UNESCO-verdensarv. Som et af de sidste stort set uberørte naturområder i Europa muliggør Vadehavet uforstyrrede økologiske processer og er et vigtigt tilflugtssted for millioner af vade- og vandfugle.

Talrige ornitologiske arrangementer i hele verdensarvsområdet bringer besøgende og lokalbefolkningen tættere på fuglenes fascinerende verden. Trækfugleprofilerne, der er samlet her, giver fugleguider værdifuld støtte til ansueliggørende formidling.

God fornøjelse med brugen af profilerne

Anja Szczesinski

Peter Südbek



## Bemærkninger til brugen af profilerne

På forsiden er den enkelte art illustreret med karakteristiske tegninger og små kort over trækruiter. Bagsiden giver samlet oplysning om fuglenes kendetegn, forekomst, trækruiter, føde og sæsonmæssige forekomst.

Bestandstallene er hentet fra de seneste tilgængelige publikationer fra det trilaterale Vadehavssamarbejdes overvågningsprogram for raste- og ynglefugle, East Atlantic Flyway Assessment Report og den europæiske rødliste over fugle. For Skestorken var nyere data for hele Vadehavet allerede tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelse af denne serie, derfor er tallene fra 2022 angivet her.

## Forklaring

### Forekomst i Vadehavet

- hele året, meget almindelig
- hele året, almindelig
- hele året, i lille antal
- næsten hele året, i lille antal
- undtagelsesvis
- aldrig

### Samlet bestand

- ingen bestand
- ? - ingen data

### Ynglebiologi

- Antal æg i reden
- Rugeperiode
- Periode til unger er flyvefærdige



Almindelig ryle



Bjergirisk



Bjerglærke



Blå kærhøg



Blisgås



Bramgås



Edderfugl



Engpiber



Fjordterne



Grågås



Gravand



Hættemåge



Havterne



Hjejle



Hvidklire



Islandsk ryle



Klyde



Knortegås



Krikand



Lille kobbersneppe



Mosehornugle



Pibeand



Rødben



Rørhøg



Sandløber



Sildemåge



Skeand



Snespurv



Skestork



Sølvhejre



Sølvmåge



Sortgrå ryle



Splitterne



Stenpikker



Stenvender



Stor kobbersneppe



Stormmåge



Stor præstekrave



Storspove



Strandhjejle



Strandskade






Svartbag



Vibe

Denne oversigt viser alle trækfugleprofiler i alfabetisk rækkefølge. Placeringen af profilerne i filen følger gruppertilhørsforholdet (ænder, vadefugle osv.).

Et klik på et miniaturebillede fører direkte til den pågældende art. Knapperne   giver mulighed for at navigere mellem forsiden og bagsiden af den enkelte profil. Pilen  fører tilbage til den samlede oversigt.



# Knortegås




Illustration: Steffen Walentowitz



# Knortegås

*Branta bernicla*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII




 Brent goose

 Ringelgans

 Rotgans

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Den mindste af vores rajgæs, sort hoved og hals, hvid halsring; grå krop, flankerne noget lysere.</p> <p><b>Kønsbestemmelse:</b> Hanner er lidt større end hunner.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle uden halsring, med hvide vingebånd.</p>	<p><b>Yngler</b> næsten udelukkende på Taymirhalvøen i det nordlige Sibirien.</p> <p><b>Overvintrer</b> i mindre antal i Vadehavet, men især i Vesteuropa.</p> <p><b>Om sommeren</b> kun sporadisk i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra ved kysterne af Ishavet, ofte i kolonier på øer. Yngler lejlighedsvis i nærheden af sneugle- eller rovfuglere der, da disse rovfugle jager polarræve væk.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Strandenge og marskområder i Vadehavet og Vesteuropa</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tang, lav, mos, små planter.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Ålegræs, annelgræs, kveller, grønalger.</p>	 3–5	 24–26 dage	 ca. 40 dage
Andet						
<p><b>Ældste knortegås:</b> 28 år og 8 måneder.</p> <p><b>Bestandsnedgang</b> i 1930'erne, delvist grundet fødevaremangel (tilbagegang i ålegræsbestanden).</p> <p><b>Bestandsfremgang</b> siden 1960'erne, bl.a. på grund af forbud mod jagt, hvilket også har reduceret fuglenes flugtafstand til omkring 1/10.</p>						



**Samlet bestand (flyway) 211.000**

Bestand af rastende fugle ynglefugle\*

Vadehavet maks. 189.461 –

DK maks. 14.457 –

DE SH maks. 88.645 –

DE NDS, HH maks. 17.278 –

NL maks. 90.580 –

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Bramgåås




Illustration: Steffen Walentowitz

# Bramgås

*Branta leucopsis*







 Barnacle goose

 Weißwangengans

 Brandgans



Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Andet		
<p>Lille gås, lidt større end knor-tegås. <b>Hoved og hals sort, hvide kinder</b>, top grå/sort hvidmønstret, undersiden hvidlig.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Bagflanker på <b>ungfugle</b> diffust plettede, hos <b>ældre udfarvede fugle</b> let sribede. Tøjlestripen diffust mørk hos ungfugle, rent sort hos ældre fugle.</p>	<p><b>Yngler</b> hovedsageligt på tundraen i det nordlige Rusland. Siden 1980'erne også i Sverige, og på det seneste også i stigende grad i Vadehavet.</p> <p><b>Overvintrer</b> hovedsageligt i Vadehavet og i det tysk-hollandske lavland.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Kysttundra, ofte store kolonier og i nærheden af sneugle- eller rovfuglereeder, da disse rovfugle jager polarræve væk.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Stranden-ge og marskområder i Vadehavet, græsarealer, men også i nogle tilfælde brakmarker og landbrugsjorde.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Blade og skud fra arktiske planter.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Annelgræs og andre græsser samt vintersæd.</p>	 4-5	 24-25 dage	 40-45 dage
<p><b>Ældste bramgås:</b> 28 år.</p> <p><b>Bestanden er steget markant</b> i løbet af de sidste 20 år, delvist grundet jagtforbud. Yngleområdet i Arktis har bredt sig mod vest og er derved blevet udvidet.</p>						



Samlet bestand (flyway)		1,4 millioner	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	maks.	579.956	ca. 727
DK	maks.	126.760	ca. 6
DE	SH	maks. 189.191	ca. 386
	NDS, HH	maks. 113.406	ca. 47
NL	maks.	220.501	ca. 288

Data i individer, \*i par



# Blisgås





Illustration: Steffen Walentowitz

# Blisgås


*Anser albifrons*






 White-fronted goose

 Blässgans

 Kolgans



Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Mindre og mørkere i farven</b> end grågås.</p> <p><b>Voksne fugle</b> med tydelig sort bugstribе og hvide pandeblis er næsten umiskendelige.</p> <p><b>Ungfugle</b> har hverken bugstribе eller hvid pandeblis, men sort næbspids ("søm"). Kalder gerne og ivrigt.</p>	<p>Forskellige underarter <b>yngler</b> på tundraen i Rusland, Grønland og Nordamerika.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> i Central- og Vesteuropa såvel som i Sydøsteuropa.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Højtliggende steder i arktisk tundra</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Eng- og græsarealer, sjældnere på marker</p>	<p>Plantedele, overvejende græsser</p>	 5–6	 27–28 dage	 40–43 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 25 år og 3 måneder</p> <p>Har fået <b>navn</b> efter den <b>hvide blis over næbbet</b>.</p> <p>Den <b>globalt truede dværggås</b> har også en lys pandeblis og kan derfor let forveksles med blisgåsen – et af argumenterne for ikke at genindføre jagttid på blisgæs.</p> <p>Blisgæs danner <b>par for livet</b>.</p> <p>Mens <b>vinterbestandene</b> i Tyskland er <b>steget</b> betydeligt, er de <b>faldet</b> i det sydøstlige Europa. En vis <b>udveksling</b> mellem de to overvintringsområder er dokumenteret ved ringmærkning.</p>						



**Samlet bestand (Europa)**  
**1,18 millioner– 1,97 millioner**

Data i individer

# Grågås




Illustration: Steffen Walentowitz

# Grågås


*Anser anser*






 Greylag goose

 Graugans

 Grauwe Gans



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Største og kraftigste grågås</b> med stor, næsten trekantet orange til lyserødt næb.</p> <p><b>Forvingen</b> er tydeligt lysere end resten af vingen under flugten – et godt kendetegn for arten!</p>	<p>Pletvist udbredt fra Vesteuropa til Østasien. Udsat og naturaliseret i mange områder af Centraleuropa.</p> <p><b>Overvintrer</b> så langt mod syd som det sydvestlige Europa og selv i Nordafrika.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Hovedsageligt i vådområder inde i landet.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Eng- og græsarealer, sjældnere marker.</p>	<p>Land- og vandplanter såsom græsser, urter og stauder.</p>	 4–6	 27–29 dage	 50–60 dage
				Andet		
				<p><b>Ældste fugl:</b> 24 år.</p> <p><b>Forfaderen til tamgåsen</b>, som findes i alle variationer af den naturlige vildtfarvede dragt (sjælden) til hvid (almindelig).</p> <p><b>Yngler meget tidligt</b> på året – allerede i slutningen af marts kan de første unger klækkes.</p>		



Samlet bestand (flyway)  
**790.000**

Data i individer



# Gravand






Illustration: Steffen Walentowitz

# Gravand

*Tadorna tadorna*









I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Common shelduck

 Brandgans

 Bergeend

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi			
<p><b>Umiskendelig.</b></p> <p><b>Kønsbestemmelse:</b> Hannen med udtalt rødt næb med knop.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle ses i efteråret med brunt hoved, hvidt ansigt, mørkt plettet/nistret top og lyserødt næb.</p>	<p><b>Yngler</b> i Europa ved Nordsøen, Østersøen og Middelhavet, også ved steppesøer fra Tyrkiet til Kina. Den nordvesteuropæiske bestand <b>overvintrer</b> hovedsageligt i Vadehavet og det vestlige Europa.</p> <p><b>I fældningstiden</b> (juli–august) er næsten hele den nordvestlige europæiske bestand at finde i området omkring Elbens udmunding.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Huler i klitter (f.eks. kaninhuler), forladte rævegrave, men også menneskeskabte levesteder, såsom stenbunker, træbunker eller lignende.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Hovedsageligt mudrede tidevandsflader.</p>	<p>Hovedsageligt hvirvelløse dyr, som små snegle, muslinger, børsteorme, krebsdyr, insekter, sjældent alger.</p>	<table border="1"> <tr> <td> 8–10</td> <td> 29–31 dage</td> <td> 45–50 dage</td> </tr> </table>	 8–10	 29–31 dage	 45–50 dage
 8–10	 29–31 dage	 45–50 dage					
Andet							
<p>Bygger gerne rede i gamle grave og huler fra andre dyr – heraf <b>navnet</b>. Er systematisk placeret mellem gæs og ænder.</p> <p><b>Ældste gravand:</b> 24 år og 9 måneder.</p> <p><b>Ude af stand til at flyve</b> i ugevis i <b>fældningstiden</b> og derfor er uforstyrrede områder i Vadehavet så afgørende for arten. I et af de vigtigste fældningsområder i den tyske del af Vadehavet bores efter olie og gas! Ungerne bliver ført til gode fødeområder, der ligger op til 30 km væk.</p> <p>Flere hunner går sammen om yngelplejen og danner ”<b>børnehaver</b>”, med 20 eller flere ungfugle.</p>							



**Samlet bestand (Europa) 104.000–154.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>281.810</b>	ca. <b>7.431</b>
<b>DK</b>	maks. <b>39.329</b>	ca. <b>474</b>
<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>77.117</b>	ca. <b>2.573</b>
	<b>NDS, HH</b> maks. <b>87.758</b>	ca. <b>2.680</b>
<b>NL</b>	maks. <b>131.163</b>	ca. <b>1.694</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen ”Trækfugleprofiler” til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Pibeand



♂ Yngledragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Pibeand

## *Mareca penelope*




♂ Yngledragt







 Eurasian wigeon

 Pfeifente

 Smient



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
<p>Små svømmeænder.</p> <p><b>Han</b> med rødbrunt hoved, gullig isse, lyst hvidt felt foran vingespejlet og sort undergump.</p> <p><b>Hunnerne</b> er mere af-dæmpede i deres brunligt plettede fjerdragt.</p> <p><b>Unge fugle</b> og <b>hanner</b> i vinterdragt er ofte rødligt kastanjebrune i farven.</p>	<p><b>Yngler</b> fra det nord-vestlige Europa til det nordøstlige Asien, sjældent i Vadehavet.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> Strandenge og oversvømmede enge, Syd- og Vesteuropa. Almindelig trækfugl, men sjælden ynglefugl – kan dog i løbet af sommeren findes sporadisk i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> I vådområder med rig plantevækst.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Strandenge og oversvømmede enge, kystnære græsarealer, men også marker.</p>	<p><b>Hele året:</b> Hovedsageligt planter, græsser, ålegræs, grønalger, men også rødder og knopper.</p> <p>Fra tid til anden kan pibeænder forårsage skade på markafgrøder.</p>	 9  22–25 dage  40–45 dage
<b>Andet</b>				
<p><b>Ældste pibeand:</b> 34 år og 8 måneder.</p> <p>Pibeanden har fået <b>navn</b> efter sit karakteristiske kald – et lille fint fløjt, "wiiju".</p> <p><b>Fouragerer ofte om natten</b> i områder, der kan ligge en del kilometer fra de rasteplasser, de opholder sig på i dagtimerne.</p> <p>Pibeænder anlægger fedtdepoter, som de kan overleve på i flere dage. Hvis det ikke er muligt at søge og indtage føde på grund af eksempelvis sne, trækker de videre til et andet område.</p>				
		<b>Samlet bestand (flyway) 1,3 – 1,6 millioner</b>		
		<i>Bestand af</i>	<i>rastende fugle</i>	<i>ynglefugle*</i>
		<b>Vadehavet</b>	maks. <b>423.725</b>	ca. <b>24</b>
		<b>DK</b>	maks. <b>93.864</b>	ca. <b>0</b>
		<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>253.411</b>	ca. <b>23</b>
	<b>NDS, HH</b> maks. <b>41.135</b>	ca. <b>1</b>		
<b>NL</b>	maks. <b>112.641</b>	ca. <b>0</b>		

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Krikand



Illustration: Steffen Walentowitz




Wadden Sea National Park



# Krikand

*Anas crecca*












I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII




 Common teal

 Krickente

 Wintertaling

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Den mindste europæiske and.</b></p> <p><b>Han</b> let genkendelig på den grønne maske, det rødbrune hoved og den gulsorte undergump.</p> <p><b>Hunnens</b> fjerdragt er brunligt spættet, mens det ellers mørke næb ofte er orange ved basis. Kan ofte kendes alene på <b>størrelsen</b>, da det er vores absolut mindste and.</p> <p>Hunnen kan dog forveksles med hunner af Knarand, men de er som regel lysere med en markant lys stribe over øjet og et ensfarvet mørkt næb.</p>	<p><b>Ynglepladser</b> i det tempererede Eurasien.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> hovedsageligt i det sydlige Europa, men også så sydligt som til Sahel-området.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Lavandede indre farvande med tæt bevoksede bredder, men også i grøfter med tagrør.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Områder med lavt vand og/eller mudflader, der gerne må oversvømmes jævnligt.</p>	<p>Om vinteren hovedsageligt mindre frø, men om sommeren også små hvirvelløse dyr.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8–11</td> <td>21–23 dage</td> <td>25–30 dage</td> </tr> </table>				8–11	21–23 dage	25–30 dage
										
8–11	21–23 dage	25–30 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste fugl:</b> 21 år og 6 måneder.</p> <p><b>Navnet</b> har krikanden fået efter sit lidt specielle kald - et oftest enkeltstående og kort "kriek"!</p> <p>På grund af dens beskedne størrelse og den korte hals findes den ofte på lavere vand, end andre ænder.</p>										



Samlet bestand (flyway)		670.000	
Bestand af		rastende fugle	
		ynglefugle*	
<b>Vadehavet</b>		maks. 55.274	?
<b>DK</b>		maks. 21.888	?
<b>DE</b>	SH	maks. 23.602	?
	NDS, HH	maks. 6.029	?
<b>NL</b>		maks. 22.535	?

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Skeand



♂ Yngledragt




Illustration: Claus Rabba




# Skeand

*Spatula clypeata*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






♂ Yngledragt

 Northern shoveler

 Löffelente

 Slobeend

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Mellemstor and med <b>kort hals</b>, stort hoved og usædvanligt <b>langt, let buet næb, der i spidsen er skeagtigt udvidet</b>, hvilket får fuglens hoved til at se lidt tynget ud.</p> <p>I både <b>yngle- og vinterdragt</b> med karakteristisk lyseblå forvinge, der især er tydelig i flugten. I yngledragten har <b>hannen</b> et skinnende grønt hoved og vingespejl, hvidt bryst og rødbrun bug og flanker.</p> <p><b>Hunnen</b> har dæmpede brune nuancer, men er let genkendelig på grund af næbbets særprægede form.</p>	<p><b>Yngler</b> i Europa, Asien og Nordamerika.</p> <p><b>Overvintrer</b> hovedsageligt i Vest- og Sydvesteuropa.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Lavvandede indre farvande, søer og sumpede områder med åbent vandspejl, våde græsarealer.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Hovedsageligt indre farvande, men også oversvømmede enge.</p>	<p>Filtrerer smådyr og plantedele ud af vandet med sit særprægede og højt specialiserede næb.</p>	 8–12	 22–23 dage	 40–45 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 20 år og 4 måneder.</p> <p>Det karakteristiske <b>næb</b> har givet arten sit navn.</p> <p>Næbbet fungerer som en <b>sigte</b>, med hvilken føden filtreres ud af vandet. Svømmer under fødesøgningen ofte rundt i cirkler eller små buer.</p>						



Samlet bestand (flyway)		70.000–80.000	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet		maks. 1.0538	?
DK		maks. 1.908	?
DE	SH	maks. 6.696	?
	NDS, HH	maks. 1.289	?
NL		maks. 3.192	?

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.




# Edderfugl



Illustration: Steffen Walentowitz

# Edderfugl

## *Somateria molissima*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII







♂ Yngledragt

 Common eider

 Eiderente

 Eider

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi																	
<p>Stor og robust and med <b>trekantet gåselignende næb</b>.</p> <p><b>Hannen</b> sort for neden, hvid for oven, bryst lyserødt, hoved sort, grønt og hvidt.</p> <p><b>Hunnen</b> varm brun og sort mønstret.</p> <p>I det første år ligner <b>ungfuglene</b> af begge køn hunner, i det andet år bliver de unge hanner dog sort og hvid spættede, ligesom de voksne hanner i vinterdragt.</p>	<p>Arktiske områder af Eurasien og Nordamerika, i <b>Vadehavet findes en af de sydligste yngleforkomster</b> i Verden.</p> <p>Dele af de nordøstlige bestande trækker også til Vadehavet i fældningssæsonen (juni/juli) og om vinteren.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra, klitter, strandenge. I Niedersachsen næsten udelukkende på øer.</p> <p><b>Træk/Fældning/Vinter:</b> Lavvandede bugter med muslingebanker, kystnære områder ved Nordsøen, sandbanker og højsander, havne og moler.</p>	<p>Fremfor alt muslinger og snegle (hjerter- og blåmuslinger, strandsnegle), men også strandkrabber og andre krebsdyr.</p>	 4–6  25–28 dage  65–75 dage																	
<b>Andet</b>																					
<p><b>Ældste edderfugl:</b> 36 år og 10 måneder.</p> <p><b>Navnet</b> er antageligt afledt af det oldnordiske ord "ædr", der betyder noget i retning af andefugl.</p> <p><b>Edderdun</b> bruges stadig i dag til puder, dyner og jakker.</p> <p><b>Muslinger sluges hele</b> og knuses i edderfuglens kråse, også kaldet "muskelmaven".</p> <p>I <b>fældningstiden</b>, der varer 3–4 uger, kan edderfuglene <b>ikke flyve</b>, så derfor er kun farvande uden forstyrrelser egnede som fældningsområder for edderfuglene.</p> <p>Flere hunner går ofte sammen om yngelplejen, ved at danne "børnehaver" med mange unger.</p>																					
		<p><b>Samlet bestand (flyway) 560.000–920.000</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestand af</th> <th>rastende fugle</th> <th>ynglefugle*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Vadehavet</b></td> <td>maks. <b>18.8878</b></td> <td>ca. <b>8.163</b></td> </tr> <tr> <td><b>DK</b></td> <td>maks. <b>15.910</b></td> <td>ca. <b>489</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>DE</b></td> <td><b>SH</b> maks. <b>59.476</b></td> <td>ca. <b>1.138</b></td> </tr> <tr> <td><b>NDS, HH</b> maks. <b>33.472</b></td> <td>ca. <b>1.158</b></td> </tr> <tr> <td><b>NL</b></td> <td>maks. <b>103.774</b></td> <td>ca. <b>5.378</b></td> </tr> </tbody> </table>			Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*	<b>Vadehavet</b>	maks. <b>18.8878</b>	ca. <b>8.163</b>	<b>DK</b>	maks. <b>15.910</b>	ca. <b>489</b>	<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>59.476</b>	ca. <b>1.138</b>	<b>NDS, HH</b> maks. <b>33.472</b>	ca. <b>1.158</b>	<b>NL</b>	maks. <b>103.774</b>	ca. <b>5.378</b>
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*																			
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>18.8878</b>	ca. <b>8.163</b>																			
<b>DK</b>	maks. <b>15.910</b>	ca. <b>489</b>																			
<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>59.476</b>	ca. <b>1.138</b>																			
	<b>NDS, HH</b> maks. <b>33.472</b>	ca. <b>1.158</b>																			
<b>NL</b>	maks. <b>103.774</b>	ca. <b>5.378</b>																			

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.


# Skkestork



Illustration: Steffen Walentowitz

# Skestork

*Platalea leucorodia*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Eurasian spoonbill

 Löffler

 Lepelaar

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
<p>Let at kende på grund af den <b>snehvide fjerdragt</b> og det brede <b>skeformede næb</b>.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> <b>Voksne fugle</b> har orange-gult brystbånd, pyntefjer og gul næbspids i yngledragten. Hos <b>ungfugle</b> er næbbet i begyndelsen rosa, håndvingfjerene hvide med sorte spidser.</p>	<p>Hele Vadehavet udgør en del af artens <b>yngleområde</b>, der ellers strækker sig fra Middelhavsområdet over Østrig til dele af Asien.</p> <p><b>Overvintrer</b> i områder, der strækker sig fra det sydvestlige Europa helt ned til Senegal.</p>	<p><b>Yngletid:</b> I områder med sammenfaldne tagrørsskove, på jorden eller i træer.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Fouragerer i priler og loer i Vadehavet, saltvandssøer, damme og søer, men også grøfter i kystnære indlandsområder, der tilmed fungerer som højvandsrastepladser.</p>	<p>Små fisk, især hundestejler, vandinsekter, muslinger, snegle, krebsdyr og padder</p>	<p> 3–5</p> <p> 21–25 dage</p> <p> 45–50 dage</p>
<b>Andet</b>				
<p>Ynglede for første gang i Vadehavet i 1962 i Niedersachsen (Memmert), men så først igen i 1995. Siden da er <b>bestanden steget kraftigt</b> i hele Vadehavet.</p> <p>Mange skestorke i Vadehavet er <b>ringmærkede</b> med henblik på at opnå større indsigt i og forståelse for trækruter, populationsbiologi med videre.</p>				



Samlet bestand (flyway)		19.000–24.000	
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*	
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>8.177</b>	ca. <b>2.396</b>	
<b>DK</b>	maks. <b>352</b>	<b>0</b>	
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>1.185</b>	ca. <b>469</b>
	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>1.976</b>	ca. <b>604</b>
<b>NL</b>	maks. <b>5.007</b>	ca. <b>1.323</b>	

Data i individer, \*i par; populationsantal fra 2022

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Sølvhejre



Vinterdragt



Illustration: Steffen Walentowitz



# Sølvhejre

## Casmerodius albus



Vinterdragt

 Great white egret

 Silberreiher

 Grote zilverreiger

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
Hvid hejrefugl, som er en <b>anelse mindre</b> end fiskehejren. I vinterperioden er <b>næbbet</b> gulligt, mens det om sommeren i yngledragten er nærmest sort.	Sølvhejren er den hejreart, der har den største geografiske udbredelse, idet den <b>yngler</b> på alle kontinenter, dog undtagen Antarktis. Delvis trækfugl, men flere individer <b>overvintre</b> i stigende antal i Vesteuropa.	<b>Yngletid:</b> Store rørskove ved søer, floder, afsnørede "døde" å-slynger eller sumpe. <b>Træk/vinter:</b> Store eng- og græsningssarealer, i Vadehavet hovedsageligt ved kysterne, sjældnere på øer.	Insekter, padde, fisk, om vinteren også mus.	 3-5	 25-26 dage	 42-63 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Alder:</b> op til 22 år (ringmærket fugl).</p> <p>I de seneste år har der været en <b>kraftig stigning</b> i antallet af <b>overvintrende</b> fugle i Tyskland. Den primære årsag er formodentlig en stigning i antallet af ynglepar i Østeuropa. Størstedelen af de overvintrende fugle kommer sandsynligvis fra Rusland og Ukraine og trækker således mod nordvest. Ofte i nærheden af gæs, som holder græsset nede, og derved gør det lettere for hejren at finde føde. Sølvhejrer samles om aftenen i områder, hvor de <b>overnatter i fællesskab</b>.</p>						



Samlet bestand (Europa)  
**79.800-132.000**

Data i individer


# Blå kærhøg



Illustration: Steffen Walentowitz

# Blå kærhøg










## *Circus cyaneus*



 Hen harrier

 Kornweihe

 Blauwe kiekendief

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Stor, slank rovfugl</b>, der som regel jager med <b>let løftede vinger</b> i V-form. <b>Bredere vinger</b> end den også lidt mindre hedeheg.</p> <p><b>Hannen</b> ensfarvet grå med sorte vingespids, hvid overgump og noget lysere underside.</p> <p><b>Hunnen</b> foroven brun med hvid overgump og beige underside med mørke brysttegninger og mørke bånd på undersiden af vingerne.</p> <p><b>Ungfugle</b> er mere rødlig på undersiden.</p>	<p><b>Yngler</b> fra det sydvestlige Europa til Irland og derfra mod øst, så langt som til det østlige Sibirien.</p> <p>Nogle fugle <b>overvintrer</b> i Vesteuropa, herunder i Vadehavet, men overvintringsområderne strækker sig helt ned til den nordvestafrikanske kyst.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Moser, heder og klitter i det sydvestlige Europa, men eksempelvis også hvedemarker.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Åbne landområder som græsarealer og marker, raster i mellemhøj vegetation såsom tagrørsskove og hedemoser.</p>	<p>Især studsmus, kaniner, fugle og fugleunger.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4-6</td> <td>29-31 dage</td> <td>31-38 dage</td> </tr> </table>				4-6	29-31 dage	31-38 dage
										
4-6	29-31 dage	31-38 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste rørhøg:</b> 17 år og 1 måned.</p> <p>En han har ofte <b>flere hunner, helt op mod 7</b>.</p> <p>En af de mest <b>sjældne ynglefugle</b> i landet.</p> <p>Bestanden i Vadehavet er i øjeblikket faldende.</p> <p>Efter ødelæggelse af oprindelige ynglehabitater, primært moseområder, ses flere fugle på øerne i Vadehavet. Ringmærkning af unger for at undersøge ynglesucces i dele af Vadehavet.</p>										



**Samlet bestand (Europa) 112.000–174.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	?	ca. <b>21</b>
<b>Dänemark</b>	?	ca. <b>0</b>
<b>Deutschland</b>	<b>SH</b>	?
	<b>NDS, HH</b>	?
<b>Niederlande</b>	?	ca. <b>11</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.




# Rørhøg



Illustration: Steffen Walentowitz

# Rørhøg










## *Circus aeruginosus*




 Marsh harrier

 Rohrweihe

 Bruine kiekendief

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Stor, slank og elegant rovfugl</b>, der ofte flyver med <b>let hævede vinger i V-form</b>.</p> <p><b>Hannen</b> har grå håndsvingfjer, sorte vingspidser, brun ryg og vingeverside, rødbrun bug. Undersiden af vingerne er lys, men igen med sorte spidser.</p> <p><b>Hunnens</b> fjerdragt er nærmest ensfarvet varmt rødbrun, mens vingerne har en lys brun forkant.</p> <p><b>Ungfugle</b> som hunner, men uden den lyse forkant på vingerne.</p>	<p><b>Yngler</b> fra Vesteuropa og Nordvestafrika til det centrale Sibirien.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> overvejende syd for Sahara, i det sydlige Europa, Indien og Sydøstasien.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Rørskove, lavtliggende fugtige klitområder, korn- og rapsmarker.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Moser og landbrugsjorde.</p>	<p>Småfugle, gnavere, kyllinger, æg, men også padder og store insekter.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3–6</td> <td>31–36 dage</td> <td>38–40 dage</td> </tr> </table>				3–6	31–36 dage	38–40 dage
										
3–6	31–36 dage	38–40 dage								
				<p><b>Andet</b></p> <p><b>Ældste rørhøg:</b> 20 år og 1 måned.</p> <p><b>Navnet</b> henviser til artens foretrukne ynglehabitat, rørskove.</p>						



Samlet bestand (Europa)  
303.000–485.000

Data i individer

# Strandskade




Yngledragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Strandskade

*Haematopus ostralegus*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII







Yngledragt

 Oystercatcher

 Austernfischer

 Scholekster

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi			
<p><b>Kraftig og let genkendelig vadefugl</b>, med sort og hvid fjerdragt og orange ben og næb. I <b>vinterdragt</b> med hvid halsring.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle med mørk næbspids og mørkere ben.</p>	<p><b>Yngler</b> langs kysterne fra Frankrig til Sibirien, lokalt i Middelhavsområdet. Andre underarter i stepper fra Sortehavet til Asien.</p> <p><b>Overvintrer</b> i Vadehavet og Vesteuropa.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Vegetationsfattige eller tyndt bevoksede områder langs kysten, f.eks. strande, grusflader, strandenge, græsarealer, men også på flade tage. Søger føde på vadefladerne.</p> <p><b>Træk/Vinter:</b> Strandenge og strande, søger føde på vadefladerne.</p>	<p><b>I Vadehavet:</b> Muslinger, snegle, krabber og børstorme.</p> <p><b>Indland:</b> Regnorme med videre.</p>	 3–4	 24–27 dage	 32–35 dage	
Andet							
<p><b>Ældste Strandskade:</b> 43 år og 4 måneder.</p> <p>Har fået <b>navn</b> efter sin forkærlighed for muslinger og østers. Store muslinger og især østers er dog for tykke i skallen til at strandskaden kan få bugt med dem. Lever dog af og til af små stillehavsøsters.</p> <p><b>Forsvarer</b> rede, æg og unger med skinangreb og højlydt "skrig".</p> <p><b>Overfiskeri af muslinger</b> og <b>kolde vintre</b> kan føre til <b>store tab</b> af fugle gennem vinteren og heraf følgende bestandsudsving.</p>							
		Samlet bestand (flyway)		750.000–970.000			
		Bestand af	rastende fugle		ynglefugle*		
		Vadehavet	maks.	359.682	ca. 26.313		
		DK	maks.	39.126	ca. 1.461		
		DE	SH	maks.	93.619	ca. 9.185	
NDS, HH	maks.		115.947	ca. 7.915			
NL	maks.	141.472	ca. 7.752				

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.




# Klyde



Illustration: Steffen Walentowitz

# Klyde

*Recurvirostra avocetta*












I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Pied avocet

 Säbelschnäbler

 Kluut

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p>Let genkendelig på grund af det smalle, spidse og opad krummede næb.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Hos ungfugle er de ellers sorte partier af fjerdragten brunlige.</p>	<p><b>Yngler</b> ved kysterne i den vestlige del af Østersøen og helt over til Frankrig, i Middelhavsområdet såvel som i steppeområder fra Ungarn til Kina. Yngler endvidere i Øst- og Sydafrika.</p> <p>Den samlede ynglebestand i Nordsøen og Østersøen samles i få områder i Vadehavet for at fælde deres fjer og skifte fjerdragt.</p> <p><b>Overvintringsområdet</b> strækker sig hovedsageligt fra den franske Atlanterhavskyst ned til Senegal.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Yngler i vegetationsfattige områder på kysten, f.eks. områder med grus og sten eller strandenge.</p> <p><b>Træk/Vinter:</b> Højvandsrastepladser består fortrinsvis af strandenge, mens fødesøgningen foregår på de mudrede dele af vaden.</p>	<p>Små hvirvelløse dyr som fanges på helt lavt vand - krebsdyr, insekter, lejlighedsvis også fiskeyngel. Søger føde ved at svinge den nederste opadbøjede del af næbbet gennem dynd og lavt vand.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23–25 dage</td> <td>35–42 dage</td> </tr> </table>				4	23–25 dage	35–42 dage
										
4	23–25 dage	35–42 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste klyde:</b> 27 år og 10 måneder.</p> <p>Klyden har fået <b>navn</b> efter sit karakteristiske kald – ”klyt-klyt”!</p> <p><b>Forsvarer</b> rede, æg og unger ved med heftige skinangreb og skrig at jage ”truslen” bort.</p> <p>Ungfuglene har brug for meget varme og derfor ses de ofte krybe ind under de voksnes fjerdragt.</p>										



**Samlet bestand (flyway) 100.000–110.000**

Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
<b>Wadden Sea</b>		maks. 35.424	ca. 7.179
<b>DK</b>		maks. 5.830	ca. 280
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. 3.586	ca. 2.805
	<b>NDS, HH</b>	maks. 14.711	ca. 2.136
<b>NL</b>		maks. 23.220	ca. 1.958


Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen ”Trækfugleprofiler” til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Strandhjejle



Yngledragt



Vinterdragt




Illustration: Claus Rabba (højre, flyvende), Steffen Walentowit (venstre)

# Strandhjejle

## *Pluvialis squatarola*

Yngledragt



Vinterdragt




Grey plover



Kiebitzregenpfeifer




Zilverplevier



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Mellemstor vadefugl</b> med <b>kort, lige næb</b> og <b>stort øje</b>, lidt større end Hjejlen.</p> <p><b>I alle fjerdragter er armhulefjerene sorte.</b></p> <p>På ryggen har de sorte fjer hvide spidser, hvorved oversiden får et sort- og hvidnistreret præg. I yngledragten er især hannerne rent sorte på bugen, mens det ligeledes sorte ansigt indrammes af et hvidt felt, der strækker sig fra issen og helt ned til vingens forkant. Hos hunnerne har de sorte partier anstrøg af brunt. Hos ungfugle og voksne i vinterdragt er bryst og hoved lyst med et islæt af lysebrune striber.</p>	<p><b>Yngler</b> i de arktiske egne af Nordamerika og det nordlige Rusland, men forekommer ikke som ynglefugl i Grønland og Skandinavien.</p> <p><b>Overvintrer</b> ved kysterne fra det centrale Europa helt ned på den sydlige halvkugle.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Vadeblader og strandenge og næsten uden undtagelse altid på kysten.</p>	<p>Hovedsageligt børstørme, små bløddyr og krebsdyr. I yngleområderne også insekter og bær.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26–27 dage</td> <td>23 dage</td> </tr> </table>				4	26–27 dage	23 dage
4	26–27 dage	23 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste strandhjejle:</b> 25 år og 7 måneder.</p> <p><b>Navnet</b> referer til at strandhjejlen så godt som udelukkende opholder sig på strandarealer og lignende.</p>										



Samlet bestand (flyway)		200.000
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>136.087</b>	–
<b>DK</b>	maks. <b>8.205</b>	–
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>43.354</b>
	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>32.675</b>
<b>NL</b>	maks. <b>69.499</b>	–

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Hjejle



Yngledragt



Vinterdragt



Illustration: Claus Rabba (højre, flyvende), Steffen Walentowit (venstre)

# Hjejele

*Pluvialis apricaria*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Yngledragt



Vinterdragt






Golden plover



Goldregenpfeifer



Goudplevier

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Mellemstor vadefugl</b> med <b>kort, lige næb</b> og <b>kraftige ben</b>.</p> <p>Ryg og overside i alle fjerdragter med et gyldent nistret præg. Armhulefjer er altid lyse, jf. Strandhjejlels altid sorte armhulefjer.</p> <p>I <b>yngledragt</b> med sort bug og "ansigt", hunnerne dog med brune anstrøg fremfor rent sorte tegninger.</p> <p><b>Ungfugle</b> og <b>voksne</b> i <b>vinterdragt</b> har hvid bug og nistret bryst i gyldne, sorte og hvide nuancer.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> I Østgrønland, Island, Skotland og fra Skandinavien til det nordlige Rusland. Mindre bestand i Niedersachsen.</p> <p><b>Overvintringsområde:</b> Sydvesteuropa helt ned til Nordafrika, i milde vintre overvintrer fuglene dog gerne nordligere, dermed også i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra, hede, mose.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Græsarealer og agerjord, mere sjældent i Vadehavet</p>	<p>Orme, insekter og deres larver, små snegle, bær.</p> <p>I Vadehavet forskellige børsteorme.</p>	 4	 27–30 dage	 30–35 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste Hjejele:</b> 12 år og 9 måneder.</p>						



Samlet bestand (Europa)		1,66–2,31 millioner	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet		maks. 141.632	–
DK		maks. 52.060	–
DE	SH	maks. 45.387	–
	NDS, HH	maks. 24.032	–
NL		maks. 50.551	–

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Vibe




Yngledragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Vibe

*Vanellus vanellus*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






Yngledragt

 Northern lapwing

 Kiebitz

 Kievit

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Let genkendelig grundet sin <b>flagrende flugt</b> og den karakteristiske <b>nakketop</b>. I vinterdragten er nakketoppen dog kortere. I parringsdragten har hannen længere nakketop end hunnen. Ligeledes er hannen mere ren i farverne, med sine hvide kinder og bryst og sort overside, vinger og brystbånd med grønt metallisk skær. Hunnen har brunlige anstrøg i de mørke partier af parringsdragten. Ungfugle har brunlige hovedtegninger og brunligt brystbånd.</p>	<p><b>Yngler</b> i den tempererede zone og Middelhavsområdet fra Vesteuropa til Stillehavet.</p> <p><b>Overvintrer</b> hovedsageligt i Vesteuropa og Middelhavsområdet.</p>	<p><b>Yngler</b> i den tempererede zone og Middelhavsområdet fra Vesteuropa til Stillehavet.</p> <p><b>Overvintrer</b> hovedsageligt i Vesteuropa og Middelhavsområdet.</p>	<p>Smådyr som insekter og deres larver, regnorme, græshopper, myrer o.a. Om vinteren også plantedele.</p>	 4	 26–29 dage	 35–40 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste vibe:</b> 23 år og 7 måneder.</p> <p>Artens danske <b>navn</b> relaterer sig til kaldet, et melodisk "viuu-vip"!</p> <p>I <b>parringsflugten</b> frembringer hannen ved hjælp af de yderste håndsvingfjer en susende lyd.</p>						



Samlet bestand (Europa)		3,18 – 4,59 millioner	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	maks.	120.496	ca. 10.834
DK	maks.	27.467	ca. 1.893
DE	SH	maks. 46.841	ca. 3.799
	NDS, HH	maks. 20.395	ca. 2.378
NL	maks.	41.014	ca. 2.764

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Stor præstekrave



Yngledragt



Illustration: Steffen Walentowitz



# Stor præstekrave










## *Charadrius hiaticula*




 Ringed plover

 Sandregenpfeifer

 Bontbekplevier

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p>På størrelse med en ryle, men med et <b>kort, tykt næb</b>. Ensfarvet brun overside og overvejende hvid underside.</p> <p>I <b>yngledragten</b> er næbbet orange med sort spids, benene orange, brystbåndet lukket og sort og hovedet præget af sorte og hvide tegninger.</p> <p>I <b>vinterdragten</b> er brystbåndet ikke lukket foran og de dele af yngledragten, der var sorte, er blevet brune.</p> <p>Hos <b>ungfuglene</b> er hovedets top gråspættet.</p>	<p>Underarten tundrae <b>yngler</b> fra Nordskandinavien til det østlige Sibirien. Underarten <i>hiaticula</i> fra det nordøstlige Canada over Grønland og Island til Centraleuropa, det vestlige Frankrig og det sydlige Skandinavien.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> i det sydvestlige Europa og i Afrika.</p>	<p><b>Yngletid:</b> I områder med meget kort, pletvis vegetation såsom arktisk tundra, sand-, grus- og stenstrande.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Vadeflader og strandenge ved kysten.</p>	<p>Børsteorme, krebsdyr og bløddyr, i ynglesæsonen også insekter.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21–28 dage</td> <td>24 dage</td> </tr> </table>				4	21–28 dage	24 dage
										
4	21–28 dage	24 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste Store præstekrave:</b> 20 år og 10 måneder.</p> <p>Det danske <b>navn</b> henviser til artens hvide halskrave, der giver associationer til en præstekrave.</p>										



Samlet bestand (flyway)		220.000–280.000	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet		maks. 50.651	ca. 632
DK		maks. 2.625	ca. 100
DE	SH	maks. 26.958	ca. 284
	NDS, HH	maks. 9.237	ca. 175
NL		maks. 18.999	ca. 73

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Storspove






Illustration: Steffen Walentowitz

# Storspove

## *Numenius arquata*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Eurasian curlew

 Großer Brachvogel

 Wulp

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p>Største europæiske vade-fugl, <b>langt buet næb</b>.</p> <p>Større end Småspove/ Lille Regnspove og uden dennes markante striber i hovedet.</p> <p>Hunner har ofte har et betydeligt længere næb end hannerne.</p>	<p>Vidt udbredt fra Vesteuropa til Asien.</p> <p><b>Overvintringsområderne</b> strækker sig fra Vadehavet til Nordafrika.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Hovedsageligt i hedeområder, men også på græsarealer og i fugtige klitlavninger.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Vade-flader, flodmundinger, strandenge og marsk-områder.</p>	<p>På kysten hovedsageligt muslinger, børsteorme og krabber. Inde i landet i højere grad insekter og edderkopper, men også små pattedyr, krybdyr og padder.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27–39 dage</td> <td>32–38 dage</td> </tr> </table>				4	27–39 dage	32–38 dage
										
4	27–39 dage	32–38 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste Storspove:</b> 31 år og 10 måneder.</p> <p>Ynglesucces i indlandet er stærkt aftagende på grund af moderne produktions- og dyrkningsmetoder samt strukturændringer i landbruget, hvilket resulterer i færre egnede yngleområder.</p> <p>Storspoven vælger desværre ofte at yngle i allerede kendte områder, også selvom disse ikke længere er egnede.</p>										



**Samlet bestand (flyway) 610.000–830.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>265.335</b>	ca. <b>505</b>
<b>DK</b>	maks. <b>18.713</b>	ca. <b>48</b>
<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>44.827</b>	ca. <b>0</b>
	<b>NDS, HH</b> maks. <b>84.599</b>	ca. <b>118</b>
<b>NL</b>	maks. <b>145.916</b>	ca. <b>339</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Stor kobbersneppe



Illustration: Steffen Walentowitz

# Stor kobbersneppe

*Limosa limosa*






I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII




 Black-tailed godwit

 Uferschnepfe

 Grutto

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Store, lange ben og <b>langt, lige næb</b>. Hos dens mindre slægtning, Lille kobbersneppe, er næbbet normalt bøjet let opad. I flugten ses det hvide og sorte halebånd og de hvide vingebånd, mens Lille kobbersneppe ikke har disse kendetegn. Bryst og hals orange.</p> <p><b>Bestemmelse af køn:</b> Hunnerne er større og har længere næb end hannerne.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle har ingen mørke bånd hen over brystet og fjerene på oversiden er uden sorte centre.</p>	<p>Fra Vesteuropa til Asien, også Island (underarten <i>islandica</i>).</p> <p>Centraleuropæiske fugle <b>overvintrer</b> især fra det sydvestlige Frankrig til det vestlige Afrika.</p> <p>Underarten <i>islandica</i> sporadisk også i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Fugtige, ekstensivt udnyttede enge.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Flodmundinger, laguner, flodsletter, sjældent strandenge og vadeflader.</p>	<p>Alsidigt fødeindtag bestående af regnorme, biller og snegle, om vinteren også plantefrø.</p>	 4	 22–24 dage	 25–30 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste Store kobbersneppe:</b> 23 år og 6 måneder.</p> <p>Den centraleuropæisk <b>bestand</b> af Stor kobbersneppe er i <b>stærk tilbagegang</b>, på <b>Island</b> er bestanden <b>stærkt stigende</b> og derfra foregår endda spredning til Norge.</p>						




Samlet bestand (Europa)		272.000–334.000	
Bestand af		rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet		?	ca. 2.472
DK		?	ca. 299
DE	SH	?	ca. 620
	NDS, HH	?	ca. 461
NL		?	ca. 1.092

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Lille kobbersneppe



Vinterdragt

Yngledragt




*Limosa lapponica lapponica*  
*Limosa lapponica taymyrensis*

Illustration: Steffen Walentowitz

# Lille kobbersneppe

*Limosa lapponica*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Yngledragt







Vinterdragt

 Bar-tailed godwit

 Pfuhschnepfe

 Rosse grutto

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
<p><b>Lange ben</b>, men dog kortere end hos Stor kobbersneppe, længere, <b>let opadbøjet næb</b>, hos Stor kobbersneppe er næbbet for det meste helt lige.</p> <p><b>Kønsbestemmelse:</b> Hunner større end hanner, hannerne i yngledragten kraftigt rustrøde på bryst og underside, hunnerne lidt svagere farvet.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle om efteråret ligner hunner, men med et mere lyst brunt bryst.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Arktis fra Skandinavien til Alaska. Fugle i Vadehavet fra det nordlige Skandinavien (<i>lapponica</i>) og Sibirien (<i>taymyrensis</i>).</p> <p><b>Overvintringsområde:</b> Vestlige Europa (skandinaviske ynglefugle) og Vestafrika (sibiriske ynglefugle).</p>	<p><b>Yngletid:</b> Fugtig tundra.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Mudderflader, strandenge og sandbanker.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Hovedsageligt insekter.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Hovedsageligt orme, små muslinger, snegle og krabber.</p>	   <p>3–4    20–21 dage    ca. 28 dage</p>
<b>Andet</b>				
<p><b>Ældste Lille kobbersneppe:</b> 33 år og 1 måned.</p> <p>Skandinaviske ynglefugle <b>overvintrer</b> meget tættere på ynglepladserne.</p> <p><b>Forekomst forår:</b> <i>lapponica</i> marts/april, <i>taymyrensis</i> i slutningen af april–slutningen af maj.</p> <p>Trækker fra Alaska til Australien i et <b>stræk uden stop</b> (13.500 km på 11 dage).</p>				



Samlet bestand (flyway)		530.000 – 600.000
<i>Limosa lapponica lapponica</i>		150.000 – 180.000
<i>Limosa lapponica taymyrensis</i>		380.000 – 420.000
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	maks. 296.799	–
DK	maks. 42.546	–
DE	SH maks. 70.552	–
	NDS, HH maks. 37.623	–
NL	maks. 183.468	–

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.




# Rødben



Illustration: Steffen Walentowitz

# Rødben

*Tringa totanus*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Common redshank

 Rotschenkel

 Tureluur

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
Lange, <b>knaldrøde ben, rødt næb med mørk spids</b> , oversiden brun med lyse pletter. Undersiden er hvidlig med tydelige brune striber på brystet. I flugten ses den brede hvide bagkant på vingerne tydeligt. <b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle med mere orangefarvede ben og tydeligt gullig-hvid plettet overside.	<b>Yngler</b> både ved kysterne og i vådområder inde i landet, fra Europa til Asien. <b>Overvintringsområderne</b> findes især i Middelhavsområdet og i Vesteuropa, men også i Vadehavet.	<b>Yngletid:</b> Strandeng, våde enge, højlandsheder, moser og sumpområder. <b>Træk/vinter:</b> Hovedsageligt på vadeflader, men også salte eller ferske enge.	På kysten og vade-fladerne hovedsageligt børsteorme, krebsdyr, muslinger og snegle. Inde i landet smådyr, som insekter og deres larver, regnorme m.m.	 4  22–29 dage  35 dage
<b>Andet</b>				
<b>Ældste rødben:</b> 26 år og 11 måneder. <b>Navnet</b> henviser til de lange, kraftigt farvede ben. Under et lavvande kan en fugl æde op mod <b>12.000 slikkrebs</b> . I indlandsområderne er <b>bestandene i kraftig tilbagegang</b> , da der stort set ikke findes egnede yngleområder længere.				



**Samlet bestand (Europa) 522.000–694.000**

*Bestand af* *rastende fugle* *ynglefugle\**

**Vadehavet** maks. **78.661** ca. **10.159**

**DK** maks. **12.703** ca. **1.022**

**DE** **SH** maks. **14.072** ca. **3.582**

**NDS, HH** maks. **10.199** ca. **3.497**

**NL** maks. **55.288** ca. **2.058**

Data i individer. \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Hvidklire



Vinterdragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Hvidklire

*Tringa nebularia*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Vinterdragt

 Common greenshank

 Grünschenkel

 Groenpootruiter

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
Mellemstor vadefugl med lange, <b>grønlig ben</b> og langt, <b>let opadbøjet næb</b> . I flugten er halen overvejende hvid og med tydelig <b>hvid rygkile</b> . Oversiden er grå, i yngledragt med sorte pletter, undersiden hvid med mørkebrune aftegninger på brystet.	<b>Yngleområder</b> i bæltet omkring Taiga, i Eurasien fra Skotland til Sibirien. <b>Overvintringsområderne</b> strækker sig fra det sydvestlige Europa og Afrika helt til Australien. Fugle, der trækker gennem Vadehavet, overvintrer især i Vestafrika.	<b>Yngletid:</b> Moser og heder med sparsomt trædække. <b>Træk/vinter:</b> Lavvandede områder på vaderne, laguner, strandenge, oversvømmede arealer og damme.	Hvirvelløse dyr, der lever i mudder og på lavt vand, som f.eks. børsteorme, krebsdyr, insekter og deres larver, men også småfisk og haletudser.	 4	 23–26 dage	 25–31 dage

## Andet

**Ældste Hvidklire:** 24 år og 5 måneder.

**Navnet** henviser formodentligt til at fuglen er betydeligt lysere end de fleste andre klirer.

**Jager** ofte på lavt vand, hvor den **bevæger sig hurtigt** og rykvist efter eksempelvis småfisk.

**Kaldet** er et højlydt "tju-tju-tju"!




**Samlet bestand (flyway) 230.000–360.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>23.804</b>	–
<b>DK</b>	maks. <b>4.369</b>	–
<b>DE</b>	<b>SH</b> maks. <b>7.075</b>	–
	<b>NDS, HH</b> maks. <b>4.741</b>	–
<b>NL</b>	maks. <b>10.864</b>	–

Data i individer, \*i par



# Stenvender



Vinterdragt



Yngledragt




Illustration: Claus Rabba (venstre), Steffen Walentowitz (højre)



# Stenvender

*Arenaria interpres*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Yngledragt


Vinterdragt

 Ruddy turnstone

 Steinwalzer

 Steenloper

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Kort, tykt og spidst neb,</b> bredt og sort brystband, orange ben.</p> <p>Spraglet <b>parringsdragt</b> med orange nuancer pa oversiden, sorte og hvide aftegninger pa hovedet.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle har i efteraret lysere ben, og dækfjer med lyse bremmer pa oversiden.</p>	<p><b>Yngleomrade:</b> Arktis (cirkumpolart), yngler undtagelsesvist i Vadehavet.</p> <p><b>Overvintringsomrade:</b> Pa kyster i snart sagt alle dele af Verden. I Vadehavet fugle fra det nordostlige Canada, Gronland, Skandinavien og Rusland.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra, isar ved kyster.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Nasten udelukkende ved kyster, frem for alt i stenede omrader, men ogsa pa vaden.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Plantefro og insekter.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Krebsdyr, muslinger og snegle, orme, men ogsa affald og dsler.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22–24 dage</td> <td>19–21 dage</td> </tr> </table>				4	22–24 dage	19–21 dage
										
4	22–24 dage	19–21 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste Stenvender:</b> 21 ar og 5 maneder. Vender i sin fodesøgning utallige sten, heraf <b>navnet</b>.</p> <p>En Stenvender ringmarket i Holland blev den folgende vinter registreret i <b>Sydamerika</b>. Det er pavist at Stenvendere i Stillehavsomraderne foretager <b>nonstop-flyvninger</b> pa op til 7.600 km fra Australien til Taiwan.</p>										



Samlet bestand (flyway)		244.000–347.000	
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*	
Vadehavet	maks. 11.518	–	
DK	maks. 242	–	
DE	SH	maks. 2.506	–
	NDS, HH	maks. 3.106	–
NL	maks. 7.186	–	

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Islandsk ryle



Yngledragt



Vinterdragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Islandsk ryle

## *Calidris canutus*

Yngledragt



Vinterdragt

 Red knot

 Knutt

 Kanoet



Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p>En plump bygget ryle, med ret korte ben og næb. Kobberød på bryst og bug i paringsdragten. Vinterdragten er hvidlig grå med lyse fjerbræmmer på oversiden.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle ligner voksne i vinterdragt, men kan have et let rosa skær.</p>	<p>Ynglepladser i arktisk Grønland og nordøstlige Canada (underarten <i>islandica</i>) eller ibirien (underarten <i>canutus</i>). Begge er almindelige i Vadehavet, overvintringsområderne er tydeligt adskilte (<i>canutus</i>: Mauretanien/Guinea-Bissau, <i>islandica</i>: Storbritannien/Vadehavet).</p>	<p><b>Yngletid:</b> I tør arktisk tundra.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Vadeflader, rasteplasser på strandenge og sandbanker.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Insekter og plantedele.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Særligt små muslinger, f.eks. østersø- og hjertemuslinger, snegle, også små krebsdyr, lejlighedsvis børsteorme.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21–23 dage</td> <td>19 dage</td> </tr> </table>				4	21–23 dage	19 dage
										
4	21–23 dage	19 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste Islandske ryle:</b> 26 år og 8 måneder.</p> <p>Grundet muslingefiskeri i Holland er de primære fødeemner blevet stærkt reduceret, og dermed er de Islandske ryler nu også blevet meget sjældnere. Foretager træk på omkring 4000 km uden mellemlanding fra Vadehavet til Sibirien.</p> <p>Vægtforøgelse under rast i Vadehavet: 140 g (ankomst) til 240 g (afgang).</p>										



**Samlet bestand (flyway)** 570.000–635.000

*Calidris canutus canutus* 260.000–275.000

*Calidris canutus islandica* 310.000–360.000

Bestand af	rastende fugle		ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks.	<b>358.629</b>	år
<b>DK</b>	maks.	<b>98.352</b>	–
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks.	<b>161.373</b>
	<b>NDS, HH</b>	maks.	<b>31.595</b>
<b>NL</b>	maks.	<b>205.195</b>	–

Data i individer, \*i par



# Sandløber



Yngledragt



Vinterdragt




Illustration: Claus Rabba (højre), Steffen Walentowitz (venstre)



# Sandløber

*Calidris alba*



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Yngledragt






Vinterdragt

 Sanderling

 Sanderling

 Drieteenstrandloper

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Typisk ryle med <b>lige</b> og helt <b>tykt næb</b>, der ofte ses spæne <b>hurtig omkring på stranden langs vandkanten</b>.</p> <p>I <b>yngledragt</b> med kridhvid bug og spættet bryst og overside i rustøde og brune nuancer.</p> <p>I <b>vinterdragten</b> bliver bryst og overside spættet lysegrå, mens bugen stadig er kridhvid.</p> <p><b>Ungfuglene</b> ligner voksne i vinterdragt, men oversiden er mørkere spættet.</p>	<p><b>Yngleområder</b> i Arktis fra Canada over Grønland og Spitsbergen, så langt som til det nordlige Rusland.</p> <p><b>Om vinteren</b> på næsten alle kyster i verden fra de tempererede breddegrader og mod syd.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Klippefyldt tundra med sparsom vegetation i nærheden af vand.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Hovedsageligt sandstrande, sjældnere på Vaden.</p>	<p>Insekter, små krebsdyr, børsteorme, små muslinger og snegle, ja selv affald og ådsler.</p>	 4	 24–32 dage	 17 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste Sandløber:</b> 18 år og 7 måneder.</p> <p>Det danske <b>navn</b> henviser til deres løbende adfærd på sandstrande.</p> <p>Det <b>videnskabelige navn</b> hentyder undtagelsesvis til den lyse vinterdragt og betyder ”<b>den hvide ryle</b>”.</p>						



**Samlet bestand (flyway) 200.000–250.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	maks. 52.734	–
DK	maks. 5.092	–
DE	SH	maks. 16.689
	NDS, HH	maks. 3.595
NL	maks. 35.197	–

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen ”Trækfugleprofiler” til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Almindelig ryle



Yngledragt



Vinterdragt

Illustration: Steffen Walentowitz



# Almindelig ryle

## *Calidris alpina*

Yngledragt



Vinterdragt




Dunlin






Alpenstrandläufer




Bonte strandloper



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Lille ryle</b> med forholdsvis langt og <b>let buet næb</b>. Næbbet er lidt kortere end hos Krumnæbbet ryle, men længere end hos Islandsk ryle og Sandløber.</p> <p><b>Yngledragt:</b> Sort bugskjold og overside rødbrun spættet</p> <p><b>Vinterdragt:</b> Gråbrun overside og hvid underside, mens brystet er svagt stribet.</p> <p><b>Ungfugle:</b> Overside brunligt spættet, brystet er fint stribet, flanker og bug mere eller mindre sortspættet.</p>	<p><b>Yngleområder:</b> I Arktis (cirkumpolart), men også i Østersøområdet. Har tidligere ynglet i Vadehavet. Den truede underart Engryle yngler fåtaligt i fugtige græssede enge i Jylland. I sommeren kan ikke-ynglende fugle fra de arktiske bestande ses i Vadehavet.</p> <p>Kan i forbindelse med <b>trækket træffes over hele Europa</b>, men ses i stort tal i Vadehavet.</p>	<p><b>Vadehavet:</b> Børsteorme, snegle og muslinger.</p> <p><b>Yngleområde:</b> Insekter og insektlarver.</p>	<p><b>Vadehavet:</b> Børsteorme, snegle og muslinger.</p> <p><b>Yngleområde:</b> Insekter og insektlarver</p>	 4	 21–24 dage	 19–20 dage
<b>Andet</b>						
<p>70 % af ungerne dør i løbet af det første leveår.</p> <p>I Vadehavet træffes fugle fra Grønland, Island og Skandinavien og Rusland.</p> <p>Almindelige ryler er oftest <b>ekstremt knyttede til deres yngle- og rasteplasser</b>, så fuglene dukker tit op næsten samme dag på nøjagtig de samme yngle- eller rasteplasser, som årene før.</p>						



**Samlet bestand (flyway) 1,3 – 1,4 millioner**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>941.201</b>	ca. <b>23</b>
<b>DK</b>	maks. <b>191.381</b>	ca. <b>10</b>
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>227.584</b>
	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>207.661</b>
<b>NL</b>	maks. <b>488.320</b>	ca. <b>0</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Sortgrå ryle



Vinterdragt



Illustration: Steffen Walentowitz

# Sortgrå ryle

## *Calidris maritima*







Vinterdragt

 Purple sandpiper

 Meerstrandläufer

 Paarse strandloper

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
En lille <b>buttet ryle</b> , der med sine korte <b>gule ben</b> og det mørke <b>næb med orange basis</b> er relativt nem at genkende. Fjerdragten er mørkt brunlig og sodfarvet.	<b>Yngletid:</b> Nordøstlige Canada over Grønland, Island og Skandinavien til det nordvestlige Rusland. <b>Overvintrer</b> på den nord-amerikanske østkyst og på kysterne ud for Nordvest- og Vesteuropa.	<b>Yngletid:</b> Kyst- og bjergtundra. <b>Træk/vinter:</b> Klippe-kyster, moler, træffes kun på kysten.	Især muslinger og snegle (f.eks. strandsnegle), små krebsdyr (f.eks. rurer), insektlarver.	 4	 21–22 dage	 21–28 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste Sortgrå ryle:</b> 20 år og 9 måneder.</p> <p>Fuglene på Helgoland kommer hvert år tilbage til deres overvintringspladser fra sidste år.</p> <p>Det danske navn har fuglen fået på grund af sin mørke fjerdragt.</p> <p>De få, der overvintrer i Vadehavet stammer fra fjerntliggende ynglepladser i det <b>nordøstlige Canada</b>, det <b>nordlige Norge</b>, <b>Svalbard</b> og <b>Rusland</b>.</p>						



**Samlet bestand (Europa)**  
**179.000–196.000**

Data i individer

# Hættemåge



Vinterdragt



Yngledragt

Illustration: Steffen Walentowitz



# Hættemåge

## *Chroicocephalus ridibundus*



Vinterdragt













Yngledragt

 Black-headed gull

 Lachmöwe

 Kokmeeuw

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi																											
<p>Rødlige ben og næb, om vinteren med sort spids. I flugten ses de iøjnefaldende hvide ydre håndsvingfjer.</p> <p>I <b>yngledragt</b> med mørk chokoladebrun hætte og hvid øjenring.</p> <p><b>Aldersbestemmelse:</b> Ungfugle har mørkebrun ryg og vinger, men mangler hætten. I flugten er vingerens bagkant mørk. Benene er, indtil fældningen i det 2. kalenderår, orange, fremfor røde.</p>	<p><b>Vidt udbredt</b> fra Europa til Asien</p> <p><b>Overvintrer</b> i områder strækkende sig så langt syd på som til Nordafrika. Opholder sig ikke kun ved kysten, men optræder også jævnligt længere inde i landet. .</p>	<p><b>Yngletid:</b> Stranden-ge, inde i landet på øer i vådområder.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Vade-flader, enge, marker, vandløb og vådområder.</p>	<p>Meget alsidig: or-ganismer fra vaden, regnorme, insekter, affald og madrester.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3–4</td> <td>22–27 dage</td> <td>26–28 dage</td> </tr> </table>				3–4	22–27 dage	26–28 dage																					
																															
3–4	22–27 dage	26–28 dage																													
<b>Andet</b>																															
<p><b>Ældste Hættemåge:</b> 30 år og 7 måneder.</p> <p>Det danske navn har arten fået grundet yngledragtens karakteristiske mørke hætte. I gamle dage var det lovligt og almindeligt at samle og spise æg fra mågekolonier, men det er i dag ulovligt!</p> <p><b>Hættemågebestanden</b> i Vadehavet blev fra 1965–1990 op mod ti gange større, men i de senere år er bestanden desværre faldet drastisk igen.</p>																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Samlet bestand (flyway)</th> <th colspan="2">2,5–3,4 millioner</th> </tr> <tr> <th>Bestand af</th> <th>rastende fugle</th> <th colspan="2">ynglefugle*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Vadehavet</b></td> <td>maks. <b>581.153</b></td> <td colspan="2">ca. <b>113.723</b></td> </tr> <tr> <td><b>DK</b></td> <td>maks. <b>61.745</b></td> <td colspan="2">ca. <b>11.037</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>DE</b></td> <td><b>SH</b></td> <td>maks. <b>118.999</b></td> <td>ca. <b>39.132</b></td> </tr> <tr> <td><b>NDS, HH</b></td> <td>maks. <b>174.801</b></td> <td>ca. <b>24.753</b></td> </tr> <tr> <td><b>NL</b></td> <td>maks. <b>253.591</b></td> <td colspan="2">ca. <b>38.801</b></td> </tr> </tbody> </table>			Samlet bestand (flyway)		2,5–3,4 millioner		Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*		<b>Vadehavet</b>	maks. <b>581.153</b>	ca. <b>113.723</b>		<b>DK</b>	maks. <b>61.745</b>	ca. <b>11.037</b>		<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>118.999</b>	ca. <b>39.132</b>	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>174.801</b>	ca. <b>24.753</b>	<b>NL</b>	maks. <b>253.591</b>	ca. <b>38.801</b>	
Samlet bestand (flyway)		2,5–3,4 millioner																													
Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*																													
<b>Vadehavet</b>	maks. <b>581.153</b>	ca. <b>113.723</b>																													
<b>DK</b>	maks. <b>61.745</b>	ca. <b>11.037</b>																													
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>118.999</b>	ca. <b>39.132</b>																												
	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>174.801</b>	ca. <b>24.753</b>																												
<b>NL</b>	maks. <b>253.591</b>	ca. <b>38.801</b>																													

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Stormmåge




Illustration: Steffen Walentowitz



# Stormmåge

*Larus canus*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Common gull

 Sturmmöwe

 Stormmeeuw

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Lille måge</b> med <b>lange vinger</b> og tyndt næb. Kønsmoden efter tre år. Ligner i farvedragten Sølvmågen, men er væsentligt mindre, mere elegant og har et lidt rundere hoved med mørke "milde" øjne, hvor Sølvmågens øjne er "skarpe" og gule.</p> <p><b>Benene er gule</b>, mens Sølvmågens er blegt "kødfarvede". Det gule næb er, modsat Sølvmågens, uden rød gonysplet.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Britiske Øer til Asien og endda Nordamerika, træffes også ofte inde i landet. Fugle i Vadehavet stammer hovedsageligt fra Nord- og Østeuropa.</p> <p><b>Vinter:</b> Nordsøen, Østersøen og det østlige Atlanterhav, mod syd til det nordvestlige Afrika. Ikke sjældent inde i landet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Klitter og moser, mere sjældent på strandenge.</p> <p><b>Vinter:</b> Græsarealer, vadeflader, strandenge, sågar lossepladser.</p>	<p>Regnorme på græsarealer, børsteorme på vaden, men også insekter, fisk, madaffald og planter.</p>	 3	 23–28 dage	 28–33 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste ringmærkede fugl:</b> 33 år og 8 måneder.</p> <p>Som andre måger ægte opportuniste, så ynglefugle kan også finde på at spise bær og frugter i store mængder, hvis lejligheden byder sig.</p>						



Samlet bestand (flyway)		1,4–2 millioner	
Bestand af		rastende fugle	
		ynglefugle*	
<b>Vadehavet</b>		maks. <b>183.120</b>	ca. <b>12.224</b>
<b>DK</b>		maks. <b>22.280</b>	ca. <b>1.425</b>
<b>DE</b>	<b>SH</b>	maks. <b>35.326</b>	ca. <b>2.538</b>
	<b>NDS, HH</b>	maks. <b>42.251</b>	ca. <b>6.393</b>
<b>NL</b>		maks. <b>108.837</b>	ca. <b>1.868</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.


# Svartbag



Illustration: Steffen Walentowitz

# Svartbag

*Larus marinus*













I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Great black-backed gull

 Mantelmöwe

 Grote mantelmeeuw

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Den største måge i Centraleuropa.</b> Stor og kraftig måge med tykkere næb og kortere vinger end Sølvmåge og Sildemåge.</p> <p><b>Ungfugle</b> ligner unge Sildemåger, men ryg og overside er lysere og finere mønstret. Hoved og underside er også lysere, mens det sorte næb er væsentligt kraftigere. Halebånd mindre tydelige, end hos unge Sildemåger, og ofte brudte.</p> <p>Fjerdragten bliver <b>med alderen</b> mere og mere mørk, men fuglene er først fuldt udfarvede i 4–5-årsalderen.</p> <p>Voksne udfarvede fugle har mørkegrå "kappe", sorte vingespidses med hvide pletter og i flugten bred hvid bagkant på vingerne. Benene er kødfarvede, mens de hos Sildemågen er gule. Det kraftige næb er gult med rød gonysplet.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Frankrigs og Storbritanniens kyster, Island til det nordvestlige Rusland.</p> <p><b>Vinter:</b> Nord-søens og Atlanterhavets kyster mod syd helt ned til Portugal.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Klippekystrer, klitter.</p> <p><b>Vinter:</b> Sandstrande, lossepladser. Søger også føde i det åbne hav. Træffes sjældent inde i landet.</p>	<p>På havet, hovedsageligt fisk og fiskeaffald, men også fugle op til andestørrelse, eksempelvis blichøns, og mindre pattedyr.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26–28 dage</td> <td>45–50 dage</td> </tr> </table>				3	26–28 dage	45–50 dage
										
3	26–28 dage	45–50 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste Svartbag:</b> 27 år og 1 måned. Navnet hentyder til fuglenes mørke, næsten sorte, ryg og vinger.</p>										
	<b>Samlet bestand (Europa)</b>		<b>172.000–215.000</b>							
	<i>Bestand af</i>	<i>rastende fugle</i>	<i>ynglefugle*</i>							
	<b>Vadehavet</b>	<b>maks. 9.620</b>	<b>ca. 64</b>							
	<b>DK</b>	<b>maks. 1.175</b>	<b>ca. 10</b>							
	<b>DE</b>	<b>SH</b>	<b>maks. 1.218</b>	<b>ca. 32</b>						
	<b>NDS, HH</b>	<b>maks. 1.251</b>	<b>ca. 5</b>							
<b>NL</b>		<b>maks. 7.580</b>	<b>ca. 17</b>							

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.


# Sølvmåge



Illustration: Steffen Walentowitz

# Sølvmåge

## Larus argentatus




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Herring gull

 Silbermöwe

 Zilvermeeuw

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi
<p><b>Ungfugle</b> er brunt spættede og ligner unge Sildemåger og Svartbage. Fjerdragten udvikler sig gradvist så fuglene får <b>hvid underside</b> og hoved og lysegrå ryg og vinger. Først i 3–4-årsalderen er fuglene fuldt udfarvede og har fået de mørke vingspidser med hvide aftegninger og gult næb med rød gonysplet.</p> <p>Betydeligt lysere kappe end Sildemåge og Svartbag. Større end Stormmåge, der desuden heller ikke har den karakteristiske gonysplet på næbbet.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Vestlige Frankrig til det nordvestlige Rusland, Island.</p> <p><b>Overvejende</b> kystnært, ofte i store kolonier.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Omstrefjende, i Vadehavet sågar fugle fra Rusland.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Uforstyrrede kystområder uden rovdyr, klitter, strandenge, klippekyster (f.eks. Helgoland).</p> <p><b>Overvintrer</b> i stort antal ved kyster eller endda på lossepladser.</p>	<p>Meget alsidig: krebsdyr, muslinger, snegle, søstjerner, fisk, ungfugle af andre arter, madaffald af enhver art, regnorme.</p>	 2–3  26–32 dage  35–50 dage
Andet				
<p><b>Ældste sølvmåge:</b> 34 år og 9 måneder.</p> <p>Navnet hentyder til den sølvgrå overside.</p> <p>Jager også fugleunger af andre arter, f.eks. vadefugle eller ternere. Såfremt de andre fugles ynglefuglebestande er sunde og robuste, er mågernes indhug i bestanden dog uproblematisk.</p> <p>Kan være nogle værre røvere, idet de visse steder kan finde på at snuppe is, pizza, fiskesandwich m.m. ud af hænderne på sagesløse cafe- og restaurantgæster, gerne i spektakulære overraskelsesangreb – så lad være med at fodre mågerne, hvor der serveres mad udendørs, det giver dem dårlige vaner! Ses ofte i nærheden af fiskekuttere, der smider fiskeaffald/bifangst overbord.</p>				



**Samlet bestand (flyway) 1,6–1,78 millioner**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	<b>maks. 164.766</b>	<b>ca. 62.278</b>
<b>DK</b>	<b>maks. 37.645</b>	<b>ca. 9.862</b>
<b>DE</b>	<b>SH maks. 27.493</b>	<b>ca. 10.576</b>
	<b>NDS, HH maks. 32.809</b>	<b>ca. 11.088</b>
<b>NL</b>	<b>maks. 109.559</b>	<b>ca. 30.752</b>

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.




# Sildemåge



Illustration: Steffen Walentowitz

# Sildemåge










*Larus fuscus*



 Lesser black-backed gull

 Heringsmöwe

 Kleine mantelmeeuw

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi			
<p>Længere vinger end Sølvmåge. <b>Ungfugle</b> ligner unge sølvmåger, men er generelt mørkere, især tertiære, og har store armdækfjer med lyse frynser og bredere halebånd.</p> <p><b>Med alderen</b> farves fjerdragten mere grålig på ryg og vinger, mens underside og hoved bliver hvidt. Først fuldt udfarvede efter 4 år.</p> <p>De udfarvede fugle er markant mørkere på ryg og vinger end Sølvmåge og har sorte vingespidsen med hvide aftegninger. <b>Benene er gule</b>, i modsætning til Sølvmåge og Svartbag, der begge har kødfarvede ben. Skelnes også nemt fra Svartbag på størrelsen, de lange, vinger, der rager tydeligt ud over halespidsen og placeringen af de hvide pletter på vingespidsene.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Kyster fra Spanien til det nordvestlige Rusland.</p> <p><b>Vinter:</b> Hovedsageligt Spanien, Portugal, Marokko, Mauretania, Senegal. En sjælden gang i mellem også i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Uforstyrrede kystområder uden rovdyr, især i klitter. Fødesøgning sker på åbent hav eller på græsarealer.</p> <p><b>Vinter:</b> Sandstrande, lossepladser, dog også fødesøgning på det åbne hav.</p>	<p>Fisk på vandoverfladen og svømmekrabber, såvel som fiskerifaffald. På græsarealer ofte regnorme og insekter, på lossepladser madaffald.</p>	<table border="1"> <tr> <td> 2-3</td> <td> 26-31 dage</td> <td> 35-40 dage</td> </tr> </table>	 2-3	 26-31 dage	 35-40 dage
 2-3	 26-31 dage	 35-40 dage					
<b>Andet</b>							
<p><b>Ældste ringmærkede fugl:</b> 34 år og 11 måneder.</p> <p>I Europa yngler <b>tre underarter</b>, den centraleuropæiske (<i>L. f. intermedius</i>) er i øjeblikket i kraftig vækst, mens den nordøst-skandinaviske underart (<i>L. f. fuscus</i>) desværre oplever en bestandsnedgang.</p>							



**Samlet bestand (flyway) 1,04 – 1,11 millioner**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
<b>Vadehavet</b>	?	ca. <b>94.496</b>
<b>DK</b>	?	ca. <b>1.788</b>
<b>DE</b>	<b>SH</b>	?
	<b>NDS, HH</b>	?
<b>NL</b>	?	ca. <b>52.868</b>


Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Splitterne



Vinterdragt



Yngledragt




Illustration: Claus Rabba (li), Steffen Walentowitz (re.)



# Splitterne





## *Thalasseus sandvicensis*



 Sandwich tern

 Brandseeschwalbe

 Grote stern

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Stor, lys terne, der i yngle- dragten har <b>mørk hætte</b> og nakketop. Det sorte næb har en markant <b>gul spids</b>. I vinterdragt med hvid pande. <b>Ungfuglene</b> er markant mere spættede på oversi- den end andre terner og næbbet uden gul spids.</p>	<p>Nord- og Østersøens <b>kyster</b>, det østlige Atlanterhav, Mittel- havet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav. <b>Overvintringsområder</b> fra Spanien til Sydafrika.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Store, tætte kolo- nier i områder med lav ve- getation på øer og halvøer, grus- og sandbanker. Fødesøgningen sker ofte i områder langt væk fra ko- lonierne, ofte mere end 50 kilometer væk. <b>Træk/vinter:</b> Kyststrækning- er, rasteplasser findes ho- vedsageligt på sandstrande.</p>	<p>Slanke stimefisk på 5–15 cm i størrelse.</p>	 1–2	 22–26 Tage	 25–35 Tage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 30 år og 9 måneder. <b>Navnet</b> er formodentligt afledt af fuglens lange nakkefjer, der kan rejses til en top. Yngleområder er begrænset til nogle få, store kolonier, som kan veksle fra år til år. Kaldet er et skingert og højlydt, "kir-rik"!</p>						
	<b>Samlet bestand (flyway)</b>		<b>170.000–200.000</b>			
	<i>Bestand af</i>	<i>rastende fugle</i>	<i>ynglefugle*</i>			
	<b>Vadehavet</b>	?	ca. <b>15.780</b>			
	<b>DK</b>	?	ca. <b>147</b>			
	<b>DE</b>	<b>SH</b>	?	ca. <b>3.100</b>		
	<b>NDS, HH</b>	?	ca. <b>4.249</b>			
<b>NL</b>	?	ca. <b>8.284</b>				

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler"  
til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Fjordterne





Illustration: Steffen Walentowitz





# Fjordterne

*Sterna hirundo*













I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Common tern

 Flusseeeschwalbe

 Visdief

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p><b>Svær at skelne fra Havternen</b>, men fjordternens ben er lidt længere og hos siddende/stående fugle rækker vingespidserne ud over halepidsen, mens det ellers røde næb har en sort spids. Ligeledes er vingerne mindre gennemskinnelige, end hos havternen og har en bredere mørkt bagkant.</p> <p><b>Ungfugle</b> med meget mørke "skuldre", og spættet overside, rød næbbasis.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Fra Vesteuropa til Asien og Nordamerika. Yngler også inde i landet.</p> <p><b>Vinter:</b> Hovedsageligt kyster i Vestafrika.</p>	<p><b>Yngleplads:</b> Strandede, grus- og sandarealer. Fødesøgning i større vandløb og tidevandsrender.</p> <p><b>Vinter:</b> Ved udløb af åer i fjorde og bugter, men også større søer.</p>	<p>Små stimefisk i vandoverfladen, som sild, brisling, stavild. Krebsdyr, vandlevende insektlarver, i Østersøen også børsteorme.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2–3</td> <td>20–26 dage</td> <td>23–27 dage</td> </tr> </table>				2–3	20–26 dage	23–27 dage
										
2–3	20–26 dage	23–27 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Ældste ringmærkede fugl:</b> 33 år.</p> <p>På grund af ligheden bliver havterner og fjordterner ofte ikke bestemt til artsniveau. Det engelske øge-navn, "Comic Tern", er en heraf afledt samlebetegnelse for de to arter, ved sammentrækning af de to latinske arts-suffixer, "common" og "arctic".</p> <p>Hører til en af de <b>bedst undersøgte</b> fuglearter i verden, da forskere i Wilhelmshaven har haft en koloni under skarp videnskabelig observation i gennem snart mange år.</p> <p><b>Fuglene er meget aggressive</b> i deres forsvar, så derfor arbejder forskere i ynglekolonierne med sikkerhedshjelme.</p>										
	<b>Samlet bestand (Europa) 0,881–1,43 millioner</b>									
	<i>Bestand af</i>	<i>rastende fugle</i>	<i>ynglefugle*</i>							
	<b>Vadehavet</b>	?	ca. <b>8.375</b>							
	<b>DK</b>	?	ca. <b>88</b>							
	<b>DE</b>	SH	?	ca. <b>764</b>						
	NDS, HH	?	ca. <b>4.272</b>							
<b>NL</b>	?	ca. <b>3.251</b>								

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Havterne





Illustration: Steffen Walentowitz



# Havterne

*Sterna paradisaea*




 Arctic tern

 Küstenseeschwalbe

 Noordse stern

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Ligner fjordternen, men har korte, spinkle ben, smallere vinger og længere hale, som ofte flugter med vingespidserne, når fuglen sidder. Svingfjerene er mere gennemskinnelige, så den sorte bagkant står i skarp kontrast.</p> <p><b>Næbbet rødt</b> uden <b>sort spids</b>.</p> <p><b>Ungfugle</b> har ensfarvet sort næb, men ikke spættet ryg og mørke skuldre, som unge fjordterner.</p>	<p><b>Yngleområde:</b> Arktis (cirkumpolart), i Europa ned til Storbritannien og Vadehavet.</p> <p><b>Om vinteren:</b> Antarktiske farvande, hovedsageligt Wedellhavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Sandstrande med sparsom vegetation, grusøer, sjældent strandenge. Søger i højere grad føde på havet, end fjordternen.</p> <p><b>Vinter:</b> Antarktis' fiskerige farvande.</p>	<p>Små fisk og krebsdyr, indtaget af fisk er ofte mindre end hos fjordterne.</p>	 1-3	 20-22 dage	 21-24 dage
Andet						
<p><b>Ældste ringmærkede fugl:</b> 30 år og 11 måneder.</p> <p><b>Rekordholder</b> blandt langdistancetrækkere. Arktiske ynglefugle tilbagelægger omkring <b>60.000 km</b>. En fugl med GPS-sender tog en ekstra "smut-tur" fra Wedellhavet til Australien og tilbagelagde derved i trækperioden i alt <b>80.000 km</b>. Havternen er den fugleart, der ser mest <b>dagslys</b> i løbet af et år!</p> <p>Forstyr ikke havterner i yngletiden! Forældrefuglene forsvarede med <b>aggressive styrtdyk</b> både rede og unger, hvilket kan ende med, at de indtrængende "fredsforstyrrere" ender med blødende hak i hovedet.</p>						



**Samlet bestand (Europa) 1,06 – 1,51 millioner**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	?	ca. 4.849
DK	?	ca. 369
DE	SH	ca. 2.867
	NDS, HH	ca. 699
NL	?	ca. 914

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.



# Mosehornugle




Illustration: Steffen Walentowitz



# Mosehornugle

*Asio flammeus*






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Short-eared owl

 Sumpfohreule

 Velduil

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Mellemstor ugle med lange vinger</b> og små "fjerører". Ligner skovhornugle, men er en smule større end denne. <b>Øjnene er gule</b>, fremfor orange, som hos skovhornuglen. I flugten ses to tydelige mørke pletter på undersiden af vingerne.</p>	<p><b>Vidt udbredt</b> i hele Eurasien, men flest i de nordlige egne. Nord- og Sydamerika og endda på enkelte øer i Mikronesien. <b>Overvintringsområderne</b> strækker sig så langt som til Nordafrika.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Åbne landskaber med lav vegetation, især tundra, moser og våde enge. <b>Træk/vinter:</b> Samme som i yngletiden, men også på brakmarker.</p>	<p>Især studs mus, i år med lav bestand disse øges andelen af andre småpattedyr og fugle i føden.</p>	 7–10	 26–27 dage	 31–36 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 20 år og 9 måneder. Har fået navn efter et af sine foretrukne "jagt-revire"-moser. <b>Jager hyppigt om dagen</b>, især i år med få byttedyr. Yngleterritoriernes størrelse afhænger af fødeudbuddet: I år med mange mus er de derfor mindre. Lever nomadisk. <b>Ungerne</b> forlader allerede reden efter 1–17 dage, til trods for, at de endnu ikke er flyvefærdige.</p>						



**Samlet bestand (Europa) 169.000–284.000**

Bestand af	rastende fugle	ynglefugle*
Vadehavet	?	ca. 68
DK	?	ca. 14
DE	SH	ca. 5
	NDS, HH	ca. 34
NL	?	ca. 15

Data i individer, \*i par

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Stenpikker




Illustration: Steffen Walentowitz



# Stenpikke


## *Oenanthe oenanthe*






 Northern wheatear

 Steinschmätzer

 Tapuit



Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi						
<p>Kan i alle fjerdragter kendes på den <b>hvide hale med sort midte</b> og sorte bånd over halespidsen.</p> <p><b>Hannens</b> fjerdragt er kontrastfyldte med sorte vinger og sort ansigtsmaske.</p> <p><b>Hun</b> og <b>ungfugle</b> i mere dæmpede gråbrune farvetoner, men stadig med mørke vinger og maske.</p>	<p><b>Yngler</b> på hele den nordlige halvkugle, helt op til Arktis, mod syd til Mellemøsten.</p> <p><b>Overvintringsområder:</b> Alle stenpikkere overvintrer i Afrika syd for Sahara,</p>	<p><b>Yngletid:</b> Åbne områder, f.eks. affaldsdynger, skovrydninger, tørvemoser, ekstensivt udnyttede landbrugsarealer, i Vadehavet, især i klitområder og her gerne i gamle kaninhuller.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Åbent terræn af enhver slags, også på diger. Ynder at kaste sig ud i jagten på smådyr fra hegnspele og små pinde, der stikker lidt op i terrænet.</p>	<p>Hovedsageligt insekter, men også edderkopper, regnorme og snegle, om efteråret også lejlighedsvis bær.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4–8</td> <td>11–15 dage</td> <td>15–17 dage</td> </tr> </table>				4–8	11–15 dage	15–17 dage
										
4–8	11–15 dage	15–17 dage								
<b>Andet</b>										
<p><b>Alder:</b> op til 9 år (ringmærket fugl). Fugle fra Alaska flyver over Rusland og Mellemøsten til Afrika, og tilbagelægger således i løbet af bare tre måneder over <b>14.000 kilometer</b>.</p> <p>Fugle fra arktisk Canada (Baffin Island) flyver til Afrika via de britiske øer. De tilbagelægger på denne flyvetur 3.400 kilometer på kun 4 dage. Fuglene trækker især om natten og kan i løbet af et døgn flyve mindst <b>850 kilometer</b>.</p>										



**Samlet bestand (Europa)**  
**10,8 millioner–29,3 millioner**

Data i individer


# Engpiber



Illustration: Steffen Walentowitz

# Engpiber

## *Anthus pratensis*







I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



 Meadow pipit

 Wiesenpieper

 Graspieper

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
Lille, <b>uanselig</b> sangfugl med et tyndt næb og relativt lang hale. Bryst og ryg fint stribet. Gør sig især bemærket med sit lokkekald, et fint, men skarpt, "tsit", nogle gange som dobbeltkald, "tsit-tsit", der høres næsten uophørligt fra fuglene, også under trækket.	<b>Yngler</b> meget ofte i store dele af Europa. Yngleområdet strækker sig mod øst til Uralbjergene og mod vest til Nordøstgrønland. <b>Overvintringsområderne</b> ligger i Central- og Vesteuropa, mod syd til Nordafrika.	<b>Yngletid:</b> Hovedsageligt fugtigt, åbent terræn, f.eks. tundraer, moser, strandenge, våde græsarealer og fugtige hedeområder. <b>Træk/vinter:</b> Samme habitater som i yngletiden.	Meget varierende, især små insekter og edderkopper, men også små orme.	 2–7	 13 dage	 12–13 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Alder:</b> højst ca. 8 år (ringmærkede fugle)</p> <p>Under trækket den <b>hyppigste af alle piber-arter</b> i Vadehavet. Kan ses og høres næsten overalt, rastende fugle især på græsarealer, ofte også på diger.</p> <p><b>Nedgang i bestanden</b> på grund af tab af levesteder, grundet intensiveret landbrugsdrift.</p> <p><b>Overvintrer</b> også på strandenge og græsarealer ved Vadehavet, men er her mindre hyppig end dens lignende slægtning Skærpiber. For skærpiberne er Vadehavet af international betydning som overvintringsområde.</p>						
 <p><b>Samlet bestand (Europa)</b> <b>22 millioner–29.8 millioner</b></p>						

Data i individer



# Bjergirisk




Vinterdragt

Illustration: Claus Rabba



# Bjergirisk

## *Linaria flavirostris*







Vinterdragt



 Twite

 Berghänfling


 Frater

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Uanselig</b> lille brun sangfugl med lille <b>gult næb</b>.</p> <p>Minder lidt om en tornirisk, men uden de tydelige hvide vingefelter og det rødlige bryst.</p> <p><b>Hannen</b> har derimod en rustrød overgump.</p>	<p><b>Yngleområderne</b> ligger i de boreale og tempererede dele af Nordvesteuropa, samt i de asiatiske bjerg- og steppeområder.</p> <p>Skandinaviske fugle <b>overvintrer</b> hovedsageligt i Vadehavet og inde i landet i Øst-europa.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Tundra, hede, alpine områder.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Strandenge og ruderater.</p>	<p>Små plantefrø, i Vadehavet dog især Kveller/Salturt og Strandgådefod.</p>	 5–6	 12–13 dage	 10–13 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 9 år og 5 måneder.</p> <p>Er en enkelt gang observeret yngle på den tyske ø, Helgoland i 1960.</p> <p>Æder, i modsætning til Bjerglærke og Snespurv, ikke i opskylszonen, men derimod direkte af planterne. Overnatter til dels i bygninger og midt i byerne. Kan under trækket opleves i store sværme, hvor fuglene er meget aktive og meget lidt sky.</p> <p><b>Strejfer vidt omkring i overvintringsområderne</b> med dagsture over 30 km og en "aktionsradius" på over 100 km i vinterområderne.</p>						
		<p><b>Samlet bestand (Europa)</b> <b>159.000–548.000</b></p>				

Data i individer

Dette ark er en del af folderen "Trækfugleprofiler" til fugleture i Nationalpark Vadehavet og Verdensarvsområdet.

# Snespurv



♂ Vinterdragt



Illustration: Claus Rabba



# Snespurv

## *Plectrophenax nivalis*






♂ Vinterdragt



 Snow bunting

 Schneeammer

 Sneeuwgor

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p><b>Kompakt</b> spurv med <b>kort og kraftigt næb</b>, der i vinteren farves gult.</p> <p>I <b>yngledragten</b> (ses kun sjældent i DK) er fuglene hvide med sort ryg, sorte vingespids og sorte øjne. Om <b>vinteren</b> er oversiden brunlig og undersiden hvidlig. Uanset fjerdragt og sæson ses altid <b>store tydelige hvide partier på vinger og hale</b>, som varierer i størrelse alt efter alder, køn og underart.</p>	<p><b>Yngleområde</b> cirkumpolart i den arktiske tundra.</p> <p><b>Overvintringsområder</b> i Europa er hovedsageligt kystnære, mens de østeuropæiske vinterkvarterer består af indlands-stepper. Islandske ynglefugle overvintrer til dels i nærheden af deres yngleområder. Østgrønlandske ynglefugle trækker til Europa, mens de skandinaviske ynglefugles overvintringskvarterer indtil videre er ukendte.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Åben tundra med laver, især i klippefuldt terræn.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Sparsomt bevoksede områder, i Vadehavet på sandstrande og i opskylszonen.</p>	<p><b>Sommer:</b> Hovedsageligt insekter.</p> <p><b>Om vinteren:</b> Frø, lejlighedsvis insekter.</p>	 5–6	 12–13 dage	 12–15 dage
<b>Andet</b>						
<p><b>Ældste fugl:</b> 9 år og 6 måneder.</p> <p><b>Navn</b> på baggrund af den hvide farve og de ofte snedækkede levesteder. Den <b>nordligst</b> ynglende sangfugl!</p>						



Samlet bestand (Europa)  
38.000–86.200

Data i individer



# Bjerglærke



Vinterdragt




Illustration: Claus Rabba



# Bjerglærke

## *Eremophila alpestris*






Vinterdragt

 Shore lark

 Ohrenlerche

 Strandleeuwerik

Kendetegn	Udbredelse	Levested	Føde	Ynglebiologi		
<p>Lærke med sort hagesmæk og <b>sort tøjle</b> (ørelapper) og <b>gulligt ansigt</b>.</p> <p>Hannen har små fjer på hovedet, som kan rejses til små "øretotter".</p> <p>Køn og alder kan umuligt bestemmes i felten med sikkerhed.</p>	<p><b>Ynglepladser</b> i tundra-områder i Eurasien og Nordamerika, såvel som i bjerge og på stepper i det sydøstlige Europa, nordvestlige Afrika, Asien og Nordamerika.</p> <p>Om <b>vinteren</b> i Europa træffes fuglene i særdeleshed i Vadehavet.</p>	<p><b>Yngletid:</b> Sparsomt bevoksede områder med lav vegetation, såsom tundraer og stepper.</p> <p><b>Træk/vinter:</b> Stepper, i Europa på strandenge eller i opskylszonen og på diger.</p>	<p><b>Sommer:</b> Insekter og andre leddyr.</p> <p><b>Vinter:</b> Små frø af især af Kveller/Salturt, Strandgåsefod og forskellige arter af mælde.</p>	 4	 10–14 dage	 9–12 dage
				Andet		
				<p><b>Ældste fugl:</b> 5 år og 10 måneder.</p> <p><b>Overvintrer i grupper.</b> I Vadehavet optager hver gruppe omkring 2,3 km strandbred og opskylszone.</p> <p>Hvert år vender fuglene tilbage til næsten præcis samme område, som de tidligere år.</p>		



**Samlet bestand (Europa)**  
**6.300–13.300**

Data i individer